

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊTSERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 2
du 8 Février 1993

TRAITEMENTS D'HIVER

ARBRES FRUITIERS

Si les traitements d'hiver n'ont pu être réalisés dans certaines situations, il est grand temps de s'en préoccuper et notamment dans votre région pour contrôler les "pucerons verts" (*Myzus persicae*), les "cochenilles du mûrier" (*Pseudaulacaspis* P)

La "Cloque" du pêcher, le "Fusicoccum" et le "monilia" de l'amandier.

Pêchers

Les attaques de "pucerons verts" deviennent de plus en plus difficile à contrôler en pleine végétation, d'une part à cause de la succession rapide des générations, d'autre part en raison des souches résistantes à des familles chimiques et enfin parce que les auxiliaires qu'ils faut sauvegarder à tout prix, ne suffisent pas toujours à endiguer ces pullulations intempestives.

LES PRODUITS

Les colorants nitrés

Vieux produits, on ne fait pas mieux même si on essaie de leur substituer des mélanges (huiles + insecticides).

Appliqués précocement, ils agissent très efficacement sur les oeufs.

Cette action doit être complétée par une seconde intervention au stade préfloral sur les femelles fondatrices qui vont éclore de ces oeufs et provoquer les futures invasions en végétation.

P.1.75

Mélanges

On leur substitue pour des raisons pratiques, les mélanges huiles + insecticides tels que :

- Euphytane + Klartan
- Ovipron + Mastor
- Ovipron + Ultracide

Quoique les colorants nitrés se soient toujours montrés plus efficaces bien que leur emploi soit déconseillé sur jeunes plantations et variétés sensibles comme Armding, Spring Crest, Meryl.

Il convient aussi de respecter un délai de 1 mois entre un D.N.O.C et ces mélanges huile + insecticide.

Régler soigneusement les pulvérisateurs, changer les pastilles, les buses.

Cochenilles

Durant la taille, on a pu repérer les encroûtements de ces parasites sur les troncs ou sous les branches maitresses.

Dans ce cas ; traiter sans tarder avec des huiles :

- Oliocin)
- Ovipron) Pas de mélange avec D.N.O.C.
- Seppic)

Cloque du pêcher

Si les traitements au cuivre ont été réalisés au gonflement, on peut réitérer en préférant l'oxyquinoléate sur variétés sensibles.

Surveillez les pointes vertes des bourgeons à bois .

Intervenir à ce stade avec :

- Captane)
- Ferbame) Traitements à renouveler
- Thirame) jusqu'à l'étalement des feuilles
- Ziranne)



* Au centre des écailles, on peut apercevoir la pointe verte ou rougeâtre de la première feuille en regardant par-dessus.

Amandiers

Attention aux attaques de "Fusicoccum", de "Monilia" et de botrytis, ce dernier fréquent en Corse.

La meilleure protection fongicide est réalisée en encadrement de la floraison avec des spécialités à base de B.M.C.

Eviter de traiter en pleine floraison.

Ne pas négliger pour autant les mesures prophylactiques qui consistent à l'élimination et l'incinération des bois de taille ; ceci est valable pour toutes les espèces.

VIGNE

Les traitements d'hiver (cf/bulletin n°1) peuvent être réalisés 10 jours après la taille et le premier gonflement des bourgeons pour "l'esca".

Pour "l'excoriose" la moitié dose 625 gr/hl d'arsenite peut être appliquée plus tardivement en prédébourrement.

Ne pas négliger l'utilisation des appareils à "panneaux récupérateurs" de bouillie :

- économique, écologique, pratique.

S.R.P.V.- 1992 - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.